



PROVENCE



NORMANDIE

CAHIERS DE LA BASSE COUR PROVENCALE



jeunes coqs cou pelé de la sainte Baume



poulette cou pelé de la sainte Baume

LA RACE PROVENCALE: LE COU PELE DE LA SAINTE BAUME



JUILLET 2019

Auteur: HILDEVERT BONDU

CONSEILS, INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

NOUS CONTACTER:

Tel: 06 80 60 91 39

ou

par mail: [bassecourprovence@orange .fr](mailto:bassecourprovence@orange.fr)

Site internet: [http//basse-cour-provencale.webnode.fr](http://basse-cour-provencale.webnode.fr)

Notre adresse:

CLAUDE PETIT

BASSE COUR PROVENCALE

151 Chemin de la RODE

83870 SIGNES



jeunes reproducteurs CPSB

LE COU PELE DE LA SAINTE BAUME

SON APPELATION

Cou pelé: expression utilisée en Provence pour définir les cous nus

Sainte BAUME : Les travaux de sélection de cette race ayant été effectués à Signes, village du versant sud de la Sainte Baume.

POURQUOI CETTE NOUVELLE RACE ?

1. Jusqu'à ce jour, il n'existait pas de race de volaille spécifique et née en PROVENCE.
2. Obtenir un poulet que nous puissions qualifier de produit **gastronomique**, en recherchant des qualités organoleptiques, gustatives spécifiques, marquées par le terroir.
3. Produire un poulet de qualité supérieure tant par ses caractéristiques génétiques que par son mode d'élevage.
4. Obtenir un niveau de performances zootechniques qui permette d'obtenir des résultats économiques satisfaisants.

Mon objectif a donc été d'obtenir une race :

- *A cou nu

- *Au plumage similaire à la Gournay : emplumement rapide, plumage serré, avec faucilles à la queue et caillouté .

- *De grande taille, avec une masse et un développement musculaire maximum, croissance rapide.

*Capable de pondre au moins 200 à 220 œufs par an de 62 gr minimum et avec une coquille de couleur blanche.

*A chair et graisse blanche

QUELLES BASES GENETIQUES ONT ETE UTILISEES ?

* Le cou nu du Forez et des cou nu issus du Bresse blanc. Utilisés pour leur caractéristique cou nu et la qualité de leur chair (tendresse, texture, développement musculaire)

Le cou nu (cou pelé en provençal) est une caractéristique génétique qui confère à ces oiseaux une meilleure adaptation aux chaleurs élevées comme le climat méditerranéen en particulier (*travaux de l'INRA*).

* La Gournay malgré qu'elle ne soit pas une race de type chair, mais de type ponte.

Cette race présente une caractéristique qui m'a semblé intéressante: le goût de sa chair; Volaille élevée pratiquement à l'état sauvage pendant des siècles et qui a conservé des saveurs typiques, proche du gibier (faisan, perdrix)

Certes, ce goût sur le CPSB n'est pas aussi prononcé, mais reste présent,

. De plus, le plumage caillouté de la Gournay donne au CPSB un aspect général attractif surtout dans un environnement boisé ou herbeux.



COU NU BLANC du FOREZ



GOURNAY



COU NU NOIR & BLANC

CARACTERISTIQUES PHENOTYPIQUES: STANDARD:

* Généralités:

Origines: Signes, la Sainte Baume, Le Var.

Créateur : Claude PETIT

Œuf à couvrir: 62 gr minimum; Recherche d'une coquille blanche.

Diamètre des bagues: coq: 22 mm; poule: 20 mm.

Masse: le plus lourd possible sans limite

* But recherché:

Volaille aux excellentes qualités de chair, honorable pondeuse, et surtout parfaitement adaptée au climat du Sud Est de la France.

Apparence générale:

Corps allongé, aux contours arrondis, donnant une impression de puissance.

Cou: long , droit, rouge vif, complètement dénudé à l'exception d'une touffe de plumes à la base, nettement dégagée et isolée.

Dos: long, large légèrement incliné vers l'arrière.

Poitrine: large, profonde, épaisse, apparait emplumée.

Abdomen: bien développé.

Ailes: portées bien collées au corps et fermées.

Queue: fermée, formant avec la ligne dorsale un angle ouvert de 110/120°, 2 grandes faucilles et nombreuses autres plus petites.



Crête: la plus grande possible avec 5 à 7 dents profondes, portée loin en arrière et dégagée de la nuque. Droite chez le coq, penché chez la poule surtout en période de ponte.

Barbillons: ovales, le plus grand possible.

Oreillons: blancs toléré sablés rouges et blancs

Face : rouge.

Yeux: à iris orangé.

Bec: jaspé, de blanc, rosé et noir de longueur moyenne.

Narines: peu apparentes.

Tête: moyenne, recouverte de plumes, jamais de huppe.



Cuisses: peu visible, cachées par le plumage serré et collant, mais très musclées sur une ossature relativement fine.

Tarses: longs, sans traces de plumes, marbrés, rosés et noirs, 4 doigts,

Plumage: emplument de type rapide, cailloutage blanc et noir(gène pi): 3 types de plumes: noires, blanches, et bariolées blanc et noir. En première année, le blanc et le noir doivent être dans des proportions égales, avec les mues successives, le blanc prend de l'importance. Le plumage est particulièrement serré au corps.

Chez les coqs, le vol et quelques rémiges principales seront blancs ou bariolés, il sera toléré un jaunissement paille sur les lancettes, du au soleil.

Les poules auront le vol et les rémiges noires ,bariolées, en première année, nous éviterons le blanc. Après la première mue saisonnière (automne, ou printemps), le blanc sera accepté.

Chair et graisse: blanches

*** Défauts graves:**

Manque d'élégance.

Ossature trop fine ou trop forte par rapport à la masse corporelle

Dos bossu, manquant de longueur

Trop léger, chétif, manque de puissance et de taille

Plumage bouffant, trop noir; plumes autres que noires, blanches ou bariolées blanc/noir, comme par exemple plumes rousses, coucou.

Oreillons rouge intégral.

Bec noir ou blanc.

Queue d'écureuil ou à angle droit, ouverte.

Tarses emplumés, noirs ou bleus., courts.

Œil à iris brun , noir ou rouge autre qu'orangé.

CARACTERISTIQUES ZOOTECHNIQUES

Poids vif à 100 jours :

Mâle	2.800 kg
Femelle	2.250 kg

Indice de consommation à 100 jours: 3.1

Poids adulte :

Mâle	4.200 kg et +
Femelle	3.500 kg et +

Ponte 200 œufs par cycle

Poids moyen des œufs

65 gr et +

Éclosabilité

Supérieure à 85 % sur œufs mis en incubation

CARACTERISTIQUES COMPORTEMENTALES:

Le cou pelé de la sainte Baume est une race calme. Toutefois le CPSB aime les parcours boisés, ombragés où il trouve graines, insectes, etc.

Il supporte très bien la chaleur.

Le cou nu est une caractéristique génétique qui lui permet de mieux se comporter aux grandes chaleurs que les autres races à cou emplumé.

Les études de l'INRA ont démontrées que la croissance n'est pas ralentie, que la qualité des coquilles d'œufs conserve leur solidité, que la mortalité est moindre.

Le CPSB se comporte donc très bien sous le climat méditerranéen et est particulièrement adapté à la Provence.

Sa rusticité est remarquable: Nous l'élevons depuis plusieurs générations sans vaccins, sans interventions médicamenteuses, la mortalité et la morbidité sont extrêmement faibles.

Grace à son tempérament calme, il n'y a pratiquement jamais d'œufs cassés dans les nids.



Parquet de reproducteurs

COMMENT SONT ELEVES NOS COU PELE DE LA SAINTE BAUME DESTINES A LA CHAIR ?

* Nous les faisons naître par lot à partir d'un incubateur artificiel.

* A la naissance, ils sont placés sous éleveuse.

* L'aliment démarrage présenté en miettes est un aliment uniquement végétal, ne contenant ni OGM, ni antibiotique.

Ils reçoivent cet aliment à volonté, jusqu'à 6 semaines d'âge.

* A partir de 6 semaines, pendant 2 semaines nous effectuons une transition avec un aliment croissance tradition présenté en granulés. Aliment végétal, sans antibiotique, sans OGM.

* De 8 à 12 semaines, ils reçoivent à volonté cet aliment croissance tradition.

* Au delà de 12 semaines:

1. Les futurs reproducteurs continuent à être alimentés avec l'aliment croissance tradition et ce jusqu'à l'entrée en reproduction, ou en ponte aux environs de l'âge de 22 semaines. Ensuite, après une transition de 15 jours ils reçoivent un aliment ponte/reproduction à volonté.

* 2. Les futurs "poulets fermiers" reçoivent une alimentation de 1/3 aliment tradition croissance; 1/3 blé; 1/3 maïs concassé.

* 3. Les futurs "poulets à la reine"; les chapons; et les poulardes reçoivent suite à une transition de 15 jours une pâté à base de lait; de céréales (blé; maïs concassé; avoine) de sel marin (Guérande); graine de lin à volonté, jusqu'à l'abattage.

* Dès l'âge de 15 jours- 3 semaines suivant les condition météorologiques et la température extérieure, ils ont accès à des parcours boisés (arbousiers, lauriers tin, etc..), ce qui leur permet de picorer: graviers, insectes, fruits, graines diverses, etc..

* Nous n'effectuons aucun vaccin.

* Tous les mois, à partir de 3 semaines, ils reçoivent dans l'eau de boisson pendant 3 jours

3 % de vinaigre de cidre afin de prévenir les risques de parasitisme: vers, coccidiose.

* Nous n'intervenons avec des médicaments qu'en cas extrêmes; La plupart des lots n'ont jamais de médicament. Si nous sommes amenés à en faire, nous l'indiquons à nos clients.

* Aucune intervention médicamenteuse n'est faite après l'âge de 12 semaines.



5 semaines sous les arbousier

A QUEL ÂGE EST -IL CONSOMMABLE ?

- * Les sujets les plus précoces sont consommables à partir de 16 semaines d'âge.
- * La majorité l'est entre 18 et 20 semaines. A cet âge la maturité des chairs est atteinte.
- * La musculature est à son optimum tant en volume qu'en qualité.
- * L'état d'engraissement est satisfaisant. Au delà , surtout chez les poulettes il peut devenir excessif. Avant 16 semaines il est insuffisant.

Dans ces tranches d'âge , la chair et les graisses sont à maturité et restent tendres, elles se tiennent à la cuisson et présentent un maximum de goût.



Poulette de 18 semaines

LA REPRODUCTION ET LA SELECTION:

Le mode d'élevage des futurs reproducteurs est similaire à celui des poulets de chair jusqu'à l'âge de 12 semaines.

A cet âge nous effectuons une première sélection sur le phénotype et sur la croissance.

Ils sont séparés des sujets déclassés de la reproduction et continuent à recevoir l'aliment traditionnel à volonté, ils sont placés dans les parquets de reproduction.

Vers l'âge de 14 / 15 semaines, ils reçoivent un vermifuge.

A 20 semaines, nous effectuons une deuxième sélection en éliminant tous les sujets qui ne correspondent pas aux critères recherchés.

Aux environs de la 22^{ème} semaine d'âge, les poulettes les plus précoces entrent en ponte.

Nous commençons alors une transition de deux semaines entre l'aliment traditionnel qu'elles recevaient et l'aliment ponte qui leur sera distribué pendant toute la période de production, à volonté.

Nous ajoutons dans une trémie indépendante de la coquille d'huître et de la graine de lin, à volonté également.

Les œufs sont collectés journallement et identifiés.

Lors de leur mise en incubation, les œufs sont placés dans des tiroirs fermés afin de suivre la filiation des poussins lors de l'éclosion.

À l'éclosion tous les poussins sont identifiés avec une bague à l'aile et enregistrés sur des livres généalogiques.

À l'âge de 60 jours, lors de la première sélection, cette bague sera doublée par une bague à la patte, ce qui permet de suivre tous les géniteurs pendant toute leur carrière et connaître leurs ascendants et descendants.

La prophylaxie est limitée à des désinfections des locaux et des équipements, à l'adjonction de 3% de vinaigre de cidre dans l'eau de boisson chaque mois, à la désinfection des parcours et à la pratique de vides sanitaires (périodes sans animaux sur le parcours et dans l'abri).

L'utilisation d'antibiotiques, ou autres substances médicamenteuses ne se font qu'en cas de force majeure (passage de virus ou maladies déclarées).

PROGRAMME D'ALIMENTATION

ANIMAUX CONCERNES	AGE	TYPE D'ALIMENT	MODE DE DISTRIBUTION
Futures pondeuses futurs reproducteurs Poulets de chair	1 jour à 5 semaines	Poussin démarrage (1er âge) miettes	A volonté
	5 à 6 semaines	transition entre le démarrage et le croissance	A volonté
	6 à 10 semaines	Croissance (2ème âge) granulés	A volonté
Poulets de chair "grains ou fermiers"	10 à 12 semaines	transition entre le croissance et la formule de finition	A volonté
	12 semaines à l'abattage	1ère formule: aliment complet finition 2 formule: 1/3 croissance 1/3 maïs concassé 1/3 blé	A volonté A volonté
Poulet à la reine chapons, poulardes	12 à 15/16 semaines	Croissance + Pâtée engraissement	A volonté pour le croissance et 100 à 150 gr par sujet pour la patée
	15 semaines à l'abattage 3 semaines minimum	Pâtée engraissement	A volonté

Les besoins nutritionnels évoluent en fonction de l'âge des animaux, il y a donc lieu d'utiliser différentes formules:

	POUSSIN DEMARRAGE	CROISSANCE	FINITION
	1ER ÂGE	2 ÈME ÂGE	
Protéines	20/21 %	17/18 %	15/16 %
Matières grasses	2.6/2.8 %	3.3/3.5 %	3.8/ 4%
Cellulose	4.5/4.6%	5.5/5.7%	4.3/4.5%
Cendres	5.8/6.2%	5/5.3%	5.4/5.6%

Pour la finition des produits festifs (poulets à la reine, chapons, poulardes) nous utilisons la formule suivante pour composer **"LA PÂTEE ENGRAISSEMENT"**

Matières premières	en kilos
*Maïs concassé	1.500
*Blé	1.500
*Avoine aplatie	0.500
*Graine de lin	0.400
*Sel de Guérande	0.050

Le tout mouillé de 5 litres de lait : 0.750 kg de poudre de lait (Agnodor) dilué dans 5 litres d'eau tiède.

Bien mélanger le tout

laisser macérer 24 à 48 heures

Et nous distribuons les quantités suivantes par sujet et par jour:

Période de la transition: (10 à 12 semaines)

* 1er; 2ème; 3 ème jour 50 gr

* 4ème; 5ème; 6ème jour 90 gr

* 7ème; 8ème; 9ème jour 120 gr

* 10ème; 11ème; 12ème jour 150gr

De la 12ème à la 14ème semaines 150/ 180 gr

Au delà et au minimum pendant 3 semaines: à volonté

Les produits festifs sont:

******Le poulet à la reine**

coqs vierges. Ils doivent être séparés des poulettes au minimum à l'âge de 12 semaines s'ils n'ont pas été sexés à 1 jour. Ils sont généralement enfermés dans l'obscurité pendant les dernières semaines par petits lots de 3/4. Ils peuvent être tués entre 16 et 20 semaines

******les chapons**

Jeunes coqs castrés destinés à l'engraissement, essentiellement limités aux périodes de fêtes de fin d'année et abattus à plus de 20 semaines

******Les Poulardes**

Jeunes poules engraisées comme les chapons essentiellement pour les périodes de fêtes . Abattues aux environs de 20 semaines

Poulets de chair (mâles ou femelles) fermiers ou poulets de grains:

.Si vous avez opté pour une race qui possède une bonne croissance, et que vous faites ce que l'on appelle des poulets fermiers, ils seront prêts pour la consommation dès l'âge de 100 jours, leur chair sera encore très tendre, à maturité et aura un bon goût de poulet fermier.

CONDITIONS D'ELEVAGE

ÂGE	POUR 100 SUJETS
1 jour à 15 jours	accès limité au cadre de 3 à 4 m ² dans le local Equipement: 1 point de chauffe; 2 abreuvoirs siphoides de 5 litres; 2 mangeoires poussins de 1ml
15 jours à 4/5 semaines	Accès au local de 10 m ² minimum Equipement: 1 abreuvoir automatique ou 2 abreuvoirs siphoides de 10 litres ; 2 mangeoires de 20 kg
Au-delà de 4/5 semaines	Retrait du cadre; local + accès au parcours à raison de 10 m ² par sujet soit 10 ares pour 100 sujets Equipement: En plus de l'équipement installé dans le local, ajoutera l'extérieur 1 mangeoire antigasp et 1 point d'eau (abreuvoir linéaire ou 20 litres siphoides)
Pour les produits festifs à partir de la 10 ^{ème} semaine	 En plus de l'équipement précédent, 6 mangeoires linéaires de 1m pour recevoir la pâtée engraissem

PROPHYLAXIE

La prophylaxie sanitaire est l'une des bases essentielles pour la réussite de l'engraissement. L'hygiène est fondamentale, les animaux doivent pouvoir vivre dans un environnement sain.

Avant la mise en place des poussins, il faut impérativement nettoyer, laver, et désinfecter les locaux et les équipements.

Ne jamais mélanger plusieurs origines, âges.

L'entretien, la désinfection des parcours doivent être tout aussi rigoureux et être désinfectés entre chaque bande, l'épandage de sulfate de fer est une bonne solution.

La prophylaxie médicale doit se limiter à des interventions très spécifiques en cas de maladies

Nous n'effectuons notamment aucun vaccin sur nos races pures, leur rusticité doit permettre de limiter l'utilisation de chimiothérapie ou antibioprophylaxie

Les interventions médicamenteuses doivent être effectuées qu'en dernier recours.

EN CONCLUSION:

C'est sur ces bases que nous avons élaboré le CPSB.

Avec le souci d'avoir une bête résistante, rustique, capable de nous apporter un produit sain, d'excellente qualité nutritionnelle et gustative et qui puisse être rentable à tous les maillons de la chaîne: reproduction, éclosabilité, engraissement.