

KISSANPENNUN LETKURUOKINTA

Älä ruoki varmuuden vuoksi.

Käytä vain kissoille tarkoitettua vastiketta.


Tuttipullolla voi syöttää, mutta vastasyntyneen pennun ruokinnassa turvallisin ja tehokkain tapa on ruokintaletkun käyttö. Jos kuitenkin ruokit tuttipullolla, varo, ettei maitoa mene keuhkoihin.

Letkulla ruokittaessa maidon määrä on täsmällinen ja pystyt mittaamaan vastikkeen määrän.

Huolehdi välineiden desinfioinnista. Käsittele välineet kiehuvalle vedelle ennen ja jälkeen ruokinnan.

Syöttöletkulla syöttämisen tekniikan oppii helposti. Tarkoitukseen suunnitellulla letkulla syöttäminen on ehdottomasti turvallisin keinoruokintamenetelmä.

Aloita punnitsemalla pentu. Syöttämistä varten mitataan letkun pituus pennun suupielestä kylkikaaren taakse ulottuvaan alueeseen. Letkuun merkitään vedenpitävällä tussilla tai värillisellä teipillä merkki, jonka avulla tiedät, kuinka paljon pujotat letkua pennun suusta mahaan.



1. merkintä letkussa – 2. keuhkot – 3. mahalaukku, Kuva: Pawpeds

Ota ruiskuun pennun ruumiinlämpöistä (kissan normaalilämpö on 38,5°C) vastiketta ja kiinnitä letku ruiskuun. Paina ensin muutaman tipan vastiketta esim. juomalasiin, jotta mahdolliset ilmakuplat poistuvat letkusta. Huolehdi, ettei ruiskuunkaan jää ilmaa.

Pentua pidetään käden sisällä siten, että peukalolla ja etusormella hallitaan päätä noin leukanivelen alueelta. Pentu on esimerkiksi pöydällä tai muulla tasaisella alustalla. Letkua pujotetaan tasaisesti ja hitaasti sisään. Mitään vastusta ei saa tuntua, edetään merkkiin asti. Jos letkua laitettaessa tuntuu vastusta ennen merkkiin pääsyä, vedetään pujotettu letku kokonaan pois ja aloitetaan alusta. Vastuksen tuntuminen saattaa merkitä, että letku on päätenyt hengitysteihin, eikä mahalaukkuun (nielurefleksi on pennuilla normaalisti hyvä, eikä ole helppoa pujottaa letkua hengitysteihin).

Jos pentu on kovin levoton, voit kietoa sen pyyhkeen sisään.

Kun merkkiin saakka on päästy, on letku mahalaukussa. Hitaasti ja rauhallisesti annetaan ruiskulla letkua pitkin kerta-annos maidonvastiketta suoraan mahalaukkuun. Tämän jälkeen letku vedetään hitaasti pois. Älä jätä letkua tarpeettomasti pennun sisälle, vaan poista se heti ruokinnan jälkeen.

Eriyisen varovainen tai kokematon letkuttaja antaa letkua pitkin tipan vettä aina ennen maidonvastiketta ja katsoo, esiintyykö yskänrefleksiä.

Kerralla syötettävän ruuan määrä lasketaan etukäteen. Laskemisessa huomioon otettavaa on maidonvastikkeen koostumus, pennun ikä sekä ruokintakertojen määrä vrk:ssa.

Jos epäillään, että pentu on energian puutteen lisäksi kuivunut (oksentanut/ripuloinut/ollut pitkään ilman ruokaa), tulee ennen ruokintaa korvata puuttuva nestemäärä. Soveltuvien menetelmien avulla annetaan nahanalaisesti 5 % glukoosiliuosta tai 5 % glukoosiliuoksen ja Ringerin liuoksen sekoitusta (sekoitus 1:1). Nesteen lämmitetään ennen antamista, ja määrä saadaan jakamalla pennun paino luvulla 33. Siis nestehoito 270 g pennulle: 8 ml 5 % glukoosia nahan alle/vrk (erittäin kuivuneilla jopa 2 x em. määrä 12 tunnin välein). Kuivunut elimistö ei imeytä ravintoa maha-suolikanavan kautta, joten nestetasapainosta huolehtiminen huonokuntoisilla pennuilla on perushoidon kulmakivi. Oma eläinlääkäri opastaa yksityiskohtaisesti tarkemmin.

Letkuruokinnasta löytyy useita videoita YouTubessa.

Yksi hyvin kuvattu opastusvideo on osoitteessa https://youtu.be/pT66-Gq_hgk

Tämä video ei ole suomenkielinen, mutta havainnollistaa ruokinnan hyvin.

Tekstien lähde: Eläinlääketieteen tohtori Suvi Pohjola-Stenroos ja Pawpeds.com

LETKUPANKKIA YLLÄPITÄÄ LÄNNEN ROTUKISSAYHDISTYS RY – WWW.LROK.FI